

【小細胞肺癌】

レジメン名称:イリノテカン(肺癌) 催吐性リスク:中等度 インターバル日数:28日 基準日:day 1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	100mg/m ²		day1.8.15		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	グラニセトロン点滴静注3mg/100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1P 3A	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間90分 投与経路:末梢ルートメイン	100mg/m ² 500ml	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4	投与順4	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day2、3	day9、10	day16、17
1	内服	デカドロン錠	4mg	4mg	4mg	4mg