

【小細胞肺癌】

インターバル日数:21日 基準日:day1

レジメン名称:カルセド[®] 催吐性リスク:中等度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
5	点滴静注	カルセド [®] 注射用	40mg/m ²		day1.2.3	—	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	点滴静注	生理食塩液 100ml パロノセトロン静注用0.75mg/.5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml 1V 6A	投与順1		
2	点滴静注	生理食塩液 デキサート注射液1.65mg/0.5ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml 4A		投与順1	投与順1
3	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間1時間 カルセド [®] を側管から投与 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順2	投与順2	投与順2
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3	投与順3	投与順3
5	点滴静注	カルセド [®] 注射用 生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	40mg/m ² 50ml	投与順4	投与順4	投与順4
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5	投与順5	投与順5