

【小細胞肺癌】

レジメン名称:分割シスプラチン+エトポシド(Split PE)

インターバル日数:21日

基準日:day 1

催吐性リスク:高度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
7	点滴静注	シスプラチン点滴静注	25mg/m ²		day1.2.3	-	炎症性
4	点滴静注	エトポシド点滴静注液	80mg/m ²		day1.2.3	PVC7リ-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	点滴静注	プロイメド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順1			
2	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 50ml 点滴静注: *点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 6A 50ml	投与順2			
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 50ml 点滴静注: *点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 50ml		投与順1	投与順1	投与順1
4	点滴静注	エトポシド点滴静注液 生理食塩液 500ml 点滴静注: *点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	80mg/m ² 500ml	投与順3	投与順2	投与順2	
5	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml 20ml ソルデム1 500ml 点滴静注: *点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 0.4A 500ml	投与順4	投与順3	投与順3	
6	点滴静注	20%マンニトール 300ml 点滴静注: *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	200ml	投与順5	投与順4	投与順4	
7	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: *点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	25mg/m ² 500ml	投与順6	投与順5	投与順5	
8	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 生理食塩液 500ml 点滴静注: *点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 500ml	投与順7	投与順6	投与順6	