

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: オプジーボ+ヤーボイ(肺癌)

インターバル日数: 42日間 基準日: day1

催吐性リスク: 最小度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	オプジーボ点滴静注	360mg/body	—	day1、day22	フィルター付き	非炎症性
4	点滴静注	ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	—	day1	フィルター付き	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day22
1	点滴静注	生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	オプジーボ点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	360mg/body 100ml	投与順2	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3	
4	点滴静注	ヤーボイ点滴静注液 生理食塩液 50ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1mg/kg 25ml	投与順4	
5	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5	投与順3