

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: オブジーボ+ヤーボイ+ペトレキセド+シスプラチン

インターバル日数: 42 日

基準日: day 1

催吐性リスク: 高度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	オブジーボ点滴静注	360mg/body	—	day1、day22	フィルター付き	非炎症性
4	点滴静注	ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	—	day1	フィルター付き	非炎症性
9	点滴静注	シスプラチン点滴静注	75mg/m ²		day1、day22		炎症性
12	点滴静注	ペトレキセド点滴静注液	500mg/m ²		day1、day22		非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day22	day23	day24
1	点滴静注	生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1			投与順1		
2	点滴静注	オブジーボ点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	360mg/body 100ml	投与順2			投与順2		
3	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3					
4	点滴静注	ヤーボイ点滴静注液 生理食塩液 50ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1mg/kg 25ml	投与順4					
5	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5			投与順3		
6	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順6			投与順4		
7	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキササート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 6A 50ml	投与順7			投与順5		
8	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml20ml 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 0.4A 500ml	投与順8			投与順6		
9	点滴静注	ペトレキセド点滴静注液 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間10分 投与経路:末梢ルートメイン	500mg/m ² 計100ml	投与順9			投与順7		
10	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順10			投与順8		
11	点滴静注	20%マンニトール 300ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	200ml	投与順11			投与順9		
12	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 計500mlになるように調製 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	75mg/m ² 計500ml	投与順12			投与順10		
13	点滴静注	生理食塩液 500ml アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 1A	投与順13			投与順11		
14	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順14			投与順12		
15	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml		投与順1	投与順1		投与順1	投与順1
16	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml		投与順2	投与順2		投与順2	投与順2
17	点滴静注	生理食塩液 20ml 点滴静注: 投与経路:末梢ルートメイン(ロック用)	20ml	投与順15	投与順3		投与順13	投与順3	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2、23	day3、24	day4、25
1	内服	デカドロン錠	8mg		8mg	8mg	8mg
2	内服	パンビタン末	1g(薬酸0.5mg)	初回投与の7日前から連日投与			
3	筋肉注射	メチコパール注射液500μg	1000μg(2A)	初回投与の7日前に投与、その後9週ごと(3コースごと)に1回投与			