

【非小細胞肺癌】

レジメン名称:カルボプラチン+アブラキサン

インターバル日数:21日

基準日:day 1

催吐性リスク:中等度

使用する抗癌剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 |
|----|------|--------------|----------------------|-----|-----------|---------|-------|
| 5 | 点滴静注 | アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m ² | | day1.8.15 | フィルター禁止 | 壊死性 |
| 7 | 点滴静注 | カルボプラチン点滴静注液 | AUC6 | | day1 | - | 炎症性 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 | day8 | day15 |
|----|------|---|------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 1 | 点滴静注 | プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン | 1V 100ml | 投与順1 | | | | |
| 2 | 点滴静注 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン | 3A 1P | 投与順2 | | | | |
| 3 | 点滴静注 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン | 4A 100ml | | | | 投与順1 | 投与順1 |
| 4 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン | 50ml | 投与順3 | | | 投与順2 | 投与順2 |
| 5 | 点滴静注 | アブラキサン点滴静注用 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン | 100mg/m ² 50ml | 投与順4 | | | 投与順3 | 投与順3 |
| 6 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン | 50ml | 投与順5 | | | 投与順4 | 投与順4 |
| 7 | 点滴静注 | カルボプラチン点滴静注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン | AUC6 250ml | 投与順6 | | | | |
| 8 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン | 50ml | 投与順7 | | | | |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 | day8 | day15 |
|----|----|--------|-------|------|------|------|------|-------|
| 1 | 内服 | デカドロン錠 | 4mg | | 4mg | 4mg | | |