

【非小細胞肺癌】

レジメン名称:シスプラチン+ビノレルビン

インターバル日数:21日

基準日:day 1

催吐性リスク:高度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
11	点滴静注	シスプラチン点滴静注	80mg/m ²		day1	-	炎症性
8	点滴静注	ロゼウス注	25mg/m ²		day1.8	-	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day8
1	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順1			
2	点滴静注	ハロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 6A 50ml	投与順2			
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 50ml				投与順1
4	点滴静注	アスパラギン酸カリウム10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml20ml 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 0.4A 500ml	投与順3			
5	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 ロゼウスを側管から投与 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順4			
6	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間60分 ロゼウスを側管から投与 投与経路:末梢ルートメイン	100ml				投与順2
7	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5			投与順3
8	点滴静注	ロゼウス注 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 全開 投与経路:末梢ルートメイン側管	25mg/m ² 50ml	投与順6			投与順4
9	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順7			投与順5
10	点滴静注	20%マンニトール 300ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	200ml	投与順8			
11	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	80mg/m ² 計500ml	投与順9			
12	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 500ml	投与順10			
13	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順11			
14	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml		投与順1	投与順1	
15	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml		投与順2	投与順2	
16	点滴静注	生理食塩液 20ml 点滴静注: 投与経路:末梢ルートメイン(ロック用)	20ml	投与順12	投与順3		

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン錠	8mg		8mg	8mg	8mg