

【非小細胞肺癌】

レジメン名称:ドセタキセル+サイラムザ

インターバル日数:21日間 基準日:day1

催吐性リスク:軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	サイラムザ点滴静注液	10mg/kg	—	day1	フィルター付き	非炎症性
4	点滴静注	ドセタキセル	60mg/m ²	—	day1		壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポララミン注5mg 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 1A 100ml	投与順1
2	点滴静注	サイラムザ点滴静注液 生理食塩液 250ml * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	10mg/kg 250ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3
4	点滴静注	ドセタキセル点滴静注 生理食塩液 250ml * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	60mg/m ² 250ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5