

【非小細胞肺癌】

レジメン名称:パクリタキセル（肺癌）

インターバル日数:21日

基準日:day 1

催吐性リスク:軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	パクリタキセル注射用	200mg/m ²		day1	PVCフリー/フィルター付き	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml 生理食塩液100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	12A 1A 100ml	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順2
3	点滴静注	パクリタキセル注射用 大塚糖液5% 500ml 点滴静注: * 点滴時間3時間 投与経路:末梢ルートメイン	200mg/m ² 500ml	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	内服	ポララミン錠	6mg	6mg