

【急性骨髄性白血病】

レジメン名称 : AML大量AraC(CALGB地固め)

インターバル日数 : 28 日

催吐性リスク : 中等度

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4.8	中心静脈注射	キロサイドN注1g/50ml	1回2g/m ² 、1日2回12時間毎		day1、3、5	-	非炎症性	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6
1	中心静脈注射	生理食塩液500ml 点滴静注 * 点滴時間24時間 グラニセトロン、ソルコーテフ、キロサイドNを側管から投与 投与経路: CVルートメイン	500ml	投与順1	投与順2	投与順1	投与順2	投与順1	
2	中心静脈注射	グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注 9:30 (指示された時間に投与) * 点滴時間15分 投与経路: CVルートメイン側管	100ml	投与順2		投与順2		投与順2	
3	中心静脈注射	ソルコーテフ注射用 生理食塩液50ml 点滴静注 9:45 (指示された時間に投与) * 点滴時間15分 投与経路: CVルートメイン側管	100mg 50ml	投与順3		投与順3		投与順3	
4	中心静脈注射	キロサイドN注1g/50ml 生理食塩液500ml 60歳以上は1回1g/m ² に減量を考慮 点滴静注 10:00 (指示された時間に投与) * 点滴時間3時間 投与経路: CVルートメイン側管	2g/m ² 計500ml	投与順4		投与順4		投与順4	
5	中心静脈注射	生理食塩液 50ml キロサイドの流し 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVルートメイン側管	50ml	投与順5		投与順5		投与順5	
6	中心静脈注射	グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注 21:30 (指示された時間に投与) * 点滴時間15分 投与経路: CVルートメイン側管	100ml	投与順6		投与順6		投与順6	
7	中心静脈注射	ソルコーテフ注射用 生理食塩液50ml 点滴静注 21:45 (指示された時間に投与) * 点滴時間15分 投与経路: CVルートメイン側管	100mg 50ml	投与順7		投与順7		投与順7	
8	中心静脈注射	キロサイドN注1g/50ml 生理食塩液 60歳以上は1回1g/m ² に減量を考慮 点滴静注 22:00 (指示された時間に投与) * 点滴時間3時間 投与経路: CVルートメイン側管	2g/m ² 計500ml	投与順8		投与順8		投与順8	
9	中心静脈注射	生理食塩液 50ml キロサイドの流し 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVルートメイン側管	50ml		投与順1		投与順1		投与順1

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg	80mg	80mg	-
2	外用	リンデロン点眼	1日4回両眼	day1~6					