

【急性骨髄性白血病】

レジメン名称 : A-tripleV(AML地固め4)

インターバル日数 : 28 日

催吐性リスク : 中等度

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
2	中心静脈注射	エトボシド点滴静注液	100mg/m ²	-	day1~5	PVCフリー	炎症性	-
5	中心静脈注射	キロサイド注	200mg/m ²	-	day1~5	-	非炎症性	-
7	中心静脈注射	オンコピン注射用	0.8mg/m ²	2mg	day8	-	壊死性	-
8	中心静脈注射	注射用フィルデシン	2mg/m ²	-	day10	-	壊死性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day8	day10
1	中心静脈注射	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: CVメインルート	1P	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1			
2	中心静脈注射	エトボシド点滴静注液 生理食塩液500ml 点滴静注 * 点滴時間60分 投与経路: CVメインルート	100mg/m ² 500ml	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2			
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVメインルート	50ml	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3			
4	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 サブルート * 点滴時間5分 投与経路: CVサブルート	50ml	投与順4					投与順1		
5	中心静脈注射	キロサイド注 生理食塩液500ml 点滴静注 サブルート * 点滴時間24時間 投与経路: CVサブルート	200mg/m ² 500ml	投与順5	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4			
6	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVメインルート	50ml							投与順1	投与順1
7	中心静脈注射	オンコピン注射用 生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路: CVメインルート	0.8mg/m ² 50ml							投与順2	
8	中心静脈注射	注射用フィルデシン 生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路: CVメインルート	2mg/m ² 50ml								投与順2
9	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVメインルート	50ml							投与順3	投与順3

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg