

【急性骨髄性白血病】

レジメン名称 : High dose MEC

インターバル日数 : 28 日

催吐性リスク : 中等度

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4	中心静脈注射	エトボシド点滴静注液	80mg/m ²	-	day1~6	PVCフリー	炎症性	-
5	中心静脈注射	キロサイドN注	1g/m ²	-	day1~6	-	非炎症性	-
7	中心静脈注射	ノバントロン注	6mg/m ²	-	day1~6	-	壊死性	160mg/m ²

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6
1	中心静脈注射	生理食塩液500ml 点滴静注 * 点滴時間24時間 投与経路: CVメインルート	500ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	中心静脈注射	パロノセトロン静注0.75mg 生理食塩液100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: CVメインルート側管	1V 100ml	投与順2					
3	中心静脈注射	ソルコーテフ注射用100mg 生理食塩液100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: CVメインルート側管	100mg 100ml	投与順3	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
4	中心静脈注射	エトボシド点滴静注液 5%糖液 500ml 点滴静注 * 点滴時間2時間 投与経路: CVメインルート側管	80mg/m ² 500ml	投与順4	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
5	中心静脈注射	キロサイドN注 生理食塩液 500ml 点滴静注 * 点滴時間6時間 投与経路: CVメインルート側管	1g/m ² 500ml	投与順5	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4
6	中心静脈注射	ソルデム3A 500ml 点滴静注 * 点滴時間3時間 投与経路: CVメインルート側管	500ml	投与順6	投与順5	投与順5	投与順5	投与順5	投与順5
7	中心静脈注射	ノバントロン注 5%糖液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: CVメインルート側管	6mg/m ² 100ml	投与順7	投与順6	投与順6	投与順6	投与順6	投与順6
8	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVメインルート側管	50ml	投与順8	投与順7	投与順7	投与順7	投与順7	投与順7

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6
1	内服	イメドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg			
2	外用	リンデロン点眼	1日4回両眼	day1~6					