

【急性骨髄性白血病】

レジメン名称 : IDR+AraC(APL地固め3)

インターバル日数 : 28 日

催吐性リスク : 高度

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
2	中心静脈注射	イダマイシン	12mg/m <sup>2</sup>		day1~3	-	壊死性	120mg/m <sup>2</sup>
5	中心静脈注射	キロサイド	140mg/m <sup>2</sup>		day1~5	-	非炎症性	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6
1	中心静脈注射	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:CVメインルート	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	
2	中心静脈注射	イダマイシン 生理食塩液100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:CVメインルート	12mg/m <sup>2</sup> 100ml	投与順2	投与順2	投与順2			
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路:CVメインルート	50ml	投与順3	投与順3	投与順3			
4	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 サブルート * 点滴時間5分 投与経路:CVサブルート	50ml	投与順4					投与順1
5	中心静脈注射	キロサイド 生理食塩液500ml 点滴静注 サブルート * 点滴時間24時間 投与経路:CVサブルート	140mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順5	投与順4	投与順4	投与順2	投与順2	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg