

【急性骨髄性白血病】

レジメン名称 : MEC

催吐性リスク : 軽度

インターバル日数 : 28 日

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
3	中心静脈注射	ノバントロン注	8mg/m ²	-	day1~3	-	壊死性	160mg/m ²
4	中心静脈注射	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	-	day1~5	PVCフリー	炎症性	-
7	中心静脈注射	キロサイド注	100mg/m ²	-	day1~7	-	非炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8
1	中心静脈注射	生理食塩液500ml 点滴静注 * 点滴時間24時間 投与経路: CVメインルート	500ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	
2	中心静脈注射	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: CVメインルート側管	1P	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	
3	中心静脈注射	ノバントロン注 5%糖液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: CVメインルート側管	8mg/m ² 100ml	投与順3	投与順3	投与順3					
4	中心静脈注射	エトポシド点滴静注液 5%糖液 500ml 点滴静注 * 点滴時間2時間 投与経路: CVメインルート側管	100mg/m ² 500ml	投与順4	投与順4	投与順4	投与順3	投与順3			
5	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVメインルート側管	50ml	投与順5	投与順5	投与順5	投与順4	投与順4			
6	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 サブルート * 点滴時間5分 投与経路: CVサブルート	50ml	投与順6							
7	中心静脈注射	キロサイド注 生理食塩液500ml 点滴静注 サブルート * 点滴時間24時間 投与経路: CVサブルート	100mg/m ² 500ml	投与順7	投与順6	投与順6	投与順5	投与順5	投与順3	投与順3	
8	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 サブルート * 点滴時間5分 投与経路: CVサブルート	50ml								投与順1

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg