

【急性リンパ性白血病】

レジメン名称 : 高齢者ALL寛解導入(LALA87変法)
 催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 35日
 基準日 : day 1

★登録はday1のみ インターバル7日

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
3	点滴静注	ダウノマイシン静注用	30mg/m ²		day1,8,15,22	-	壊死性	25mg/kg
4	点滴静注	オンコビン注射用	2mg/body	2mg	day1,8,15,22	-	壊死性	
5	点滴静注	注射用エンドキサン	400mg/m ²		day1,8,15,22	-	炎症性	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15	day22
1	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	ダウノマイシン静注用 生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	30mg/m ² 100ml	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	オンコビン注射用 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	2mg/body 50ml	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4
5	点滴静注	注射用エンドキサン 生理食塩液 250ml 点滴静注 ※点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	400mg/m ² 250ml	投与順5	投与順5	投与順5	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順6	投与順6	投与順6	投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1,8,15,22	day2,9,16,23	day3,10,17,24
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg
2	内服	プレドニゾロン錠5mg	60mg/m ²	day1~22(隔日)		

- ★ 寛解導入療法として、day1、8、15、22に投与
- ★ 寛解導入療法中に2回MTX10mg/m²髄腔内投与を行う
- ★ 寛解が得られればday35から地固め療法へ移行
- ★ day15の芽球が20%未満の場合、day15、day22のダウノマイシンの投与を省略する
- ★ 寛解が得られなかった場合は、LALA87変法の地固め療法を再寛解導入療法として速やかに投与し、寛解後にもう一度同地固め療法を繰り返す