

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : CHASE

催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 21 日

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
2	中心静脈	デキササート注射液1.65mg	33mg(20A)/body	-	day1、2、3	-	-	-
3	中心静脈	注射用エンドキサン	1200mg/m ²	-	day1	-	炎症性	-
4	中心静脈	キロサイドN注1g/50ml	2g/m ²	-	day2、3	-	非炎症性	-
5	中心静脈	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	-	day1、2、3	PVC7リー	炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	中心静脈	グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間15分 投与経路: CVルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	中心静脈	デキササート注射液1.65mg 生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間15分 投与経路: CVルートメイン	20A 50ml	投与順2	投与順2	投与順2
3	中心静脈	注射用エンドキサン 生理食塩液 500ml 点滴静注 * 点滴時間2時間 投与経路: CVルートメイン	1200mg/m ² 500ml	投与順3	-	-
4	中心静脈	キロサイドN注1g/50ml 生理食塩液 500ml 60歳以上は1回1g/m ² に減量を考慮 点滴静注 計500mlになるように調製 * 点滴時間3時間 投与経路: CVルートメイン	2g/m ² 計500ml	-	投与順3	投与順3
5	中心静脈	エトポシド点滴静注液 生理食塩液 500ml 点滴静注 * 点滴時間2時間 投与経路: CVルートメイン	100mg/m ² 500ml	投与順4	投与順4	投与順4
6	中心静脈	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVルートメイン	50ml	投与順5	投与順5	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg
2	外用	リンデロン点眼	1日4回両眼	day1~day4		