

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : CMD  
 催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 21 日  
 基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg	33mg(20A)/body		day1、2、3		-	
4	点滴静注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	25mg/m <sup>2</sup>		day1、2		炎症性	
5	点滴静注	ノバントロン注	8mg/m <sup>2</sup>		day3		壊死性	160mg/m <sup>2</sup>

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg 生理食塩液100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	20A 100ml	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液 250ml 点滴静注 * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	25mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順4	投与順4	
5	点滴静注	ノバントロン注 生理食塩液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	8mg/m <sup>2</sup> 100ml			投与順4
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5	投与順5	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg