

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : ESHAP
 催吐性リスク : 高度

インターバル日数 : 21 日
 基準日 : day0 ★day0をday1として登録

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
6	点滴静注	ソルメドロール静注用	500mg	-	day1、2、3、4、5	-	-	-
7	点滴静注	エトポシド点滴静注液	40mg/m ²	-	day1、2、3、4	PVC7リ-	炎症性	-
8	点滴静注	シスプラチン点滴静注	25mg/m ²	-	day1、2、3、4	-	炎症性	-
9	点滴静注	キロサイドN注	2g/m ²	-	day5	-	炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day0	day1	day2	day3	day4	day5
1	中心静脈注射	生理食塩液 500ml 点滴静注 * 点滴時間12時間 投与経路:CVルートメイン	500ml	投与順1 点滴時間5時間	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	中心静脈注射	生理食塩液 500ml 点滴静注 * 点滴時間12時間 投与経路:CVルートメイン	500ml	投与順2 点滴時間5時間	投与順6	投与順5	投与順5	投与順5	投与順4
3	中心静脈注射	生理食塩液 500ml 点滴静注 * 点滴時間5 時間 投与経路:CVルートメイン	500ml	投与順3					
4	中心静脈注射	生理食塩液 500ml 点滴静注 * 点滴時間5時間 投与経路:CVルートメイン	500ml	投与順4					
5	中心静脈注射	パロノセトロン静注 生理食塩液100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:CVルート側管	1V 100ml		投与順2				
6	中心静脈注射	ソルメドロール静注用 生理食塩液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:CVルート側管	500mg 100ml		投与順3	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
7	中心静脈注射	エトポシド点滴静注液 5%糖液 250ml 点滴静注 * 点滴時間2時間 投与経路:CVルート側管	40mg/m ² 250ml		投与順4	投与順3	投与順3	投与順3	
8	中心静脈注射	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 遮光 点滴静注 * 点滴時間24時間 投与経路:CVルート側管	25mg/m ² 500ml		投与順5	投与順4	投与順4	投与順4	
9	中心静脈注射	キロサイドN注 生理食塩液 500ml 60歳以上は1回1g/m ² に減量を考慮 点滴静注 * 点滴時間2時間 投与経路:CVルート側管	2g/m ² 計500ml						投与順3

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	内服	イメドカプセル125mg、80mg		125mg	80mg	80mg		
2	外用	リンデロン点眼	1日4回両眼				day4~6	