

【成人T細胞白血病リンパ腫】

レジメン名称 : mLSG15 day15 (VECP)

催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 28 日

基準日 : day 1

★登録はインターバル3日

★登録はday15をday1とする

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
2	点滴静注	注射用フィルデシン	2.4mg/m ²	-	day15	-	壊死性	-
3	点滴静注	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	-	day15~17	PVCフリー	炎症性	-
4	点滴静注	カルボプラチン点滴静注液	250mg/m ²	-	day15	-	炎症性	-
1	内服	プレドニゾン錠5mg	40mg/m ²	-	day15~17	-	-	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day15	day16	day17
1	点滴静注	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	1P	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	フィルデシン注用 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	2.4mg/m ² 50ml	投与順2	-	-
3	点滴静注	エトポシド点滴静注液 生理食塩液 500ml 点滴静注 ※点滴時間1時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100mg/m ² 500ml	投与順3	投与順2	投与順2
4	点滴静注	カルボプラチン点滴静注液 5%糖液 250ml 点滴静注 ※点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン	250mg/m ² 250ml	投与順4	-	-
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5	投与順3	投与順3

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day15	day16	day17
1	内服	プレドニゾン錠5mg	40mg/m ²	40mg/m ²	40mg/m ²	40mg/m ²
2	内服	イメンドカプセル125mg	125mg	125mg	-	-

★ ホテリジオを併用する場合は
1~4サイクルのday12~14の間に投与