

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : R-GDP (カルボプラチン)

催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 21 日

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
3	点滴静注	ゲムシタピン点滴静注用	1000mg/m ²		day1,8	-	炎症性	
4	点滴静注	カルボプラチン点滴静注液	AUC5		day1	-	炎症性	
7	点滴静注	リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²		day8	-	非炎症性	
2	点滴静注	デキササート注射液1.65mg	33mg(20A)/body		day1	-	-	
1	内服	デカドロン錠	40mg/body		day2~4	-	-	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8
1	点滴静注	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキササート注射液1.65mg 生理食塩液50ml 点滴静注 *点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	20A 50ml	投与順2	
3	点滴静注	ゲムシタピン点滴静注用 生理食塩液100ml 点滴静注 *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1000mg/m ² 100ml	投与順3	投与順2
4	点滴静注	カルボプラチン点滴静注液 5%糖液250ml 点滴静注 *点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	AUC5 250ml	投与順4	
5	点滴静注	ボラミン注5mg/1ml 生理食塩液 50ml 点滴静注 *点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 50ml		投与順3
6	点滴静注	ソルメドロール静注125mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	125mg 100ml		投与順4
7	点滴静注	リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液 1000ml 10倍希釈になるように調製 点滴静注 ※点滴時間は主治医入力 投与経路:末梢ルートメイン	375mg/m ² 10倍希釈になる量 (主治医入力)		投与順5
8	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5	投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン錠	40mg	-	40mg	40mg	40mg
2	内服	イメンドカプセル	125mg	125mg	-	-	-