

【末梢性T細胞リンパ腫】

レジメン名称 : ジフォルタ

インターバル日数 : 49 日

催吐性リスク : 軽度

基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	ジフォルタ注射液	30mg/m ²		day1,8,15,22,29,36	-	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15	day22	day29	day36
1	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	ジフォルタ注射液 生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 全開で投与 投与経路:末梢ルートメイン	30mg/m ² 50ml	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15	day22	day29	day36
1	内服	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)
2	内服	パンピタン末	2g(葉酸1mg)	初回投与の10日以上前から連日経口投与、ジフォルタ投与終了後30日間は投与継続					
3	筋肉注射	メチコバル注射液500μg	1000μg(2A)	初回投与の10日以上前から8~10週ごとに1回筋肉内投与、ジフォルタ投与中は継続					

★ クライオセラピー 投与開始5分前から投与終了後30分（氷片を口に含み口腔内を冷却する方法）