

【成人T細胞白血病リンパ腫、末梢性T細胞リンパ腫】

レジメン名称 : ポテリジオ インターバル日数 : 7 日
 催吐性リスク : 最小度 基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	ポテリジオ点滴静注	1mg/kg	-	day1	-	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	ソルコーテフ静注用 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	100mg 50ml	投与順1
2	点滴静注	ポラミン注5mg 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 50ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順3
4	点滴静注	ポテリジオ点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注 ※点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン	1mg/kg 250ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	内服	アセトアミノフェン錠	400mg	400mg