

【血液内科 悪性リンパ腫】

レジメン名称 : 高齢者THP-COP

催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 21 日

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
3	静注	ピノルビン注射用	30mg/m ²		day1	フィルター付き	壊死性	950mg/m ²
4	静注	注射用エンドキサン	500mg/m ²		day1	-	炎症性	
5	静注	オンコビン注	1mg/m ²	2mg	day1	-	壊死性	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路: ルートキープ用	100ml	投与順1
2	点滴静注	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン	100ml	投与順2
3	点滴静注	ピノルビン注射用 大塚糖液 5% 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン	30mg/m ²	投与順3
4	点滴静注	注射用エンドキサン 生理食塩液 500ml 点滴静注 ※点滴時間2時間 投与経路末梢ルートメイン	500mg/m ² 500ml	投与順4
5	点滴静注	オンコビン注 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間10分 投与経路末梢ルートメイン	1mg/m ² 50ml	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン	50ml	投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1~5
1	内服	プレドニゾロン錠5mg	30~60mg/body	30~60mg/body