

【中枢神経原発悪性リンパ腫】

レジメン名称 : 大量AraC(PCNSL地固め)

インターバル日数

14日

催吐性リスク : 中等度

基準日 :

day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4	中心静脈注射	キロサイドN注1g/50ml	2g/m ²	6g/日	day1、2	-	非炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml 点滴静注 ルートキープ用 * 点滴時間4時間 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	中心静脈注射	グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間15分 投与経路:CVルート側管	1V	投与順2	投与順2
3	中心静脈注射	ソル・メドロール静注 生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間15分 投与経路:CVルート側管	40mg 50ml	投与順3	投与順3
4	中心静脈注射	キロサイドN注1g/50ml 生理食塩液 500ml 60歳以上は1回1g/m ² に減量を考慮 点滴静注 計500mlになるように調製 * 点滴時間3時間 投与経路:CVルート側管	2g/m ² 計500ml	投与順4	投与順4
5	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路:CVルート側管	50ml	投与順5	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg
2	外用	リンデロン点眼	1日4回両眼	day1~day3		