

【悪性黒色腫】

レジメン名称 : DAVFeron
 催吐性リスク : 高度

インターバル日数 : 28 日
 基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	標準値(参考)
3	静注	ダカルバジン注	120mg/m ²		day1-5		炎症性	80~140mg/m ²
4	静注	ニドラン注	60mg/m ²		day1		壊死性	50~80mg/m ²
5	静注	オンコピン注	0.6mg/m ²	2mg	day1		壊死性	0.5~0.8mg/m ²

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順1				
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン	6A 1A 100ml	投与順2				
2	点滴静注	大塚糖液 5% 500ml 点滴静注 ※点滴時間12時間 投与経路末梢ルートメイン	500ml	投与順3 ダカルバジン、ニドラン、オンコピンを側管から投与	投与順1 ダカルバジンを側管から投与	投与順1 ダカルバジンを側管から投与	投与順1 ダカルバジンを側管から投与	投与順1 ダカルバジンを側管から投与
3	静注	ダカルバジン注 蒸留水 20ml 遮光 静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルート側管	120mg/m ² 20ml	投与順4	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
4	静注	ニドラン注 蒸留水 20ml 静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルート側管	60mg/m ² 20ml	投与順5				
5	静注	オンコピン注 蒸留水 20ml 静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルート側管	0.6mg/m ² 20ml	投与順6				

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	8mg		8mg	8mg	8mg
2	皮内注射	フェロン300万単位	300万単位	day1-10			