

【胃癌】

レジメン名称 : TS1+シスプラチンday1.8
 催吐リスク : 高度

インターバル日数 35 日
 基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	シスプラチン点滴静注	30mg/m ²		day1.8	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day 1	day 8
1	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン	6A 1A 100ml	投与順2	投与順2
3	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液500ml 点滴静注: ※点滴時間120分 投与経路末梢ルートメイン	30mg/m ² 500ml	投与順3	投与順3
4	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: ※点滴時間60分 投与経路末梢ルートメイン	500ml	投与順4	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1.8	day2.9	day3.10	day4.11
1	内服	デカドロン	8mg		8mg	8mg	8mg
2	内服	ティーエスワン	80mg/m ²	day1~21			