

【胃癌】

レジメン名称: イリノテカン(胃癌)

インターバル日数: 35日

基準日: day 1

催吐性リスク: 中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	イリノテカン点滴静注	100mg/m ²		day1.8.15	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	3A 1P	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	イリノテカン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間90分 投与経路:末梢ルートメイン	100mg/m ² 500ml	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4	投与順4	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2,9,16	day3,10,17
2	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg