

【胃癌】

レジメン名称: サイラムザ+パクリタキセル

インターバル日数: 28日間 基準日: day1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	—	day1、15	フィルター付き	非炎症性
6	点滴静注	パクリタキセル注	80mg/m ²	—	day1、8、15	PVCフリー/フィルター付き	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポラミン注5mg ファモチジン静注 20mg/20ml グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 1A 1A 1P	投与順1		投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポラミン注5mg ファモチジン静注 20mg/20ml 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 1A 1A 100ml		投与順1	
3	点滴静注	サイラムザ点滴静注液 生理食塩液 250ml * 点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン	8mg/kg 250ml	投与順2		投与順2
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3		投与順3
5	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml		投与順2	
6	点滴静注	パクリタキセル注 生理食塩液 250ml * 点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン	80mg/m ² 250ml	投与順4	投与順3	投与順4
7	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5	投与順4	投与順5