

【胃癌】

レジメン名称 : パクリタキセル+シスプラチン

インターバル日数 : 28 日

催吐リスク : 高度

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	中心静脈注射	パクリタキセル注射液	80mg/m <sup>2</sup>		day1.8.15	PVC7リ-フィルター付き	壊死性
5	中心静脈注射	シスプラチン点滴静注	25mg/m <sup>2</sup>		day1.8.15	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	中心静脈注射	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路CVルートメイン	1V 100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	中心静脈注射	パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポララミン注5mg ファモチジン静注20mg/20ml 生理食塩液 100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路CVルートメイン	1V 6A 1A 1A 100ml	投与順2	投与順2	投与順2
3	中心静脈注射	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路CVルートメイン	100ml	投与順3	投与順3	投与順3
4	中心静脈注射	パクリタキセル注射液 生理食塩液 250ml 中心静脈注射: ※点滴時間90分 投与経路CVルートメイン	80mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順4	投与順4	投与順4
5	中心静脈注射	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 中心静脈注射: ※点滴時間90分 投与経路CVルートメイン	25mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順5	投与順5	投与順5
6	中心静脈注射	ソルアセトF 500ml 中心静脈注射: ※点滴時間60分 投与経路CVルートメイン	500ml	投与順6	投与順6	投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1.8.15	day2.9.16	day3.10.17	day4.11.18
1	内服	デカドロン	8mg		8mg	8mg	8mg