

【胃癌】

レジメン名称 : パクリタキセル1週間毎(胃癌) インターバル日数 : 28 日
 催吐リスク : 軽度 基準日: day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	パクリタキセル注射液	80mg/m ²		day1.8.15	PVCフリー/フィルター付き	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポララミン注5mg ファモチジン静注20mg/20ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 1A 1A 100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	パクリタキセル注射液 大塚糖液 5% 250ml 点滴静注: ※点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	80mg/m ² 250ml	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4	投与順4	投与順4