

【大腸癌】

レジメン名称: FOLFIRI+アービタックス2週間毎

インターバル日数: 14日

基準日: day1

催吐性リスク: 中等度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	中心静脈注射	アービタックス注射用	500mg/m <sup>2</sup>	-	day1	-	非炎症性
5	中心静脈注射	イリノテカン点滴静注	150mg/m <sup>2</sup>	-	day1	-	炎症性
4	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	-	day1	-	-
6	中心静脈注射	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	-	day1	-	炎症性
7	中心静脈注射	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	-	day1	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	中心静脈注射	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	1V 100ml	投与順1
2	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセトロン点滴静注3mg/100n ポララミン注5mg 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	4A 1P 1A	投与順2
3	中心静脈注射	アービタックス注射用 生理食塩液 500ml 中心静脈注射: * 点滴時間 2時間 投与経路:CVルートメイン	500mg/m <sup>2</sup> 計500ml	投与順3
4	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: * 点滴時間2時間 イリノテカンと同時に 投与経路:CVルートメイン側管	200mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順4
5	中心静脈注射	イリノテカン点滴静注 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: * 点滴時間2時間 レボホリナートと同時に 投与経路:CVルートメイン	150mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順5
6	中心静脈注射	5-FU注 生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	400mg/m <sup>2</sup> 50ml	投与順6
6	中心静脈注射	5-FU注 生理食塩液 中心静脈注射: * 点滴時間46時間 投与経路:CVルートメイン	2400mg/m <sup>2</sup> 適宜	投与順7

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg	4mg