

【大腸癌】

レジメン名称 : IRIS インターバル日数 : 28 日
 催吐リスク : 中等度 基準日: day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	125mg/m ²		day1.15	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day15
1	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセトロン点滴静注3mg/10 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン	4A 1P	投与順2	投与順2
3	点滴静注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液 500ml 点滴静注: ※点滴時間90分 投与経路末梢ルートメイン	125mg/m ² 500ml	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン	50ml	投与順4	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2、16	day3、17	day4、18
----	----	------	-------	------	---------	---------	---------

1	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg	4mg
2	内服	ティーエスワン	80mg/m ²	day1～day14			