

【大腸癌】

レジメン名称: アービタックス+ピラフトビ+メクトビ (2回目以降)

インターバル日数: 7日

基準日: day1

催吐性リスク: 中等度～高度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	アービタックス注射用	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	-	day1		非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	デキサート注射液 1.65mg/0.5ml ボラミン注 5mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間 30分 投与経路: 末梢ルートメイン	4A 1A 100ml	投与順1
2	点滴静注	アービタックス注射用 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間 1時間 投与経路: 末梢ルートメイン	250mg/m ² 250ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間 1時間 投与経路: 末梢ルートメイン	100ml	投与順3

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	
1	内服	ピラフトビ	1日1回 1回300mg	連日
2	内服	メクトビ	1日2回 1回45mg	連日