

【食道癌】

レジメン名称 : ドセタキセル1週間毎(+RT)(食道癌) インターバル 28 日

催吐リスク : 軽度 基準日: day 1

使用する抗がん剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 |
|----|------|-------------|---------------------|-----|-----------|-----|-------|
| 2 | 点滴静注 | ドセタキセル点滴静注液 | 25mg/m ² | | day1.8.15 | - | 壊死性 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day8 | day15 |
|----|------|---|------------------------------|------|------|-------|
| 1 | 点滴静注 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン | 4A 100ml | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 |
| 2 | 点滴静注 | ドセタキセル点滴静注液 大塚糖液 5% 250ml 点滴静注: ※点滴時間60分 投与経路末梢ルートメイン | 25mg/m ² 250ml | 投与順2 | 投与順2 | 投与順2 |
| 3 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン | 50ml | 投与順3 | 投与順3 | 投与順3 |