【食道癌】
レジメン名称：パクリタキセル1週間毎（食道癌）　　インターバル日数：49日　　基準日：day 1
催吐性リスク：軽度

使用する抗癌剤：

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	パクリタキセル注	100mg/㎡		day1,8,15,22,29,36	PVCフリー/フィルター付き	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15	day22	day29	day36
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml ポララミン注5mg 生理食塩液100ml 点滴静注： ＊点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 1A 1A 100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液　100ml 点滴静注： ＊点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	パクリタキセル注 大塚糖液5%　250ml 点滴静注： ＊点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	100mg/㎡ 250ml	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液　50ml 点滴静注： ＊点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4