【肛門癌】
レジメン名称:5-FU+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ(+RT)　　インターバル日数:28 日　　基準日:day 1
催吐性リスク:高度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
7	点滴静注	5-FU	1000mg/㎡		day1～5		炎症性
5	点滴静注	シスプラチン点滴静注	100mg/㎡		day2		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6
1	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液　100ml 点滴静注: ＊点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 100ml		投与順1				
2	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液　100ml 点滴静注: ＊点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 6A 100ml		投与順2				
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液　100ml 点滴静注: ＊点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml	投与順1 末梢ルートメイン		投与順1	投与順1	投与順1	
4	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml　20ml ソルデム1　500ml 点滴静注: ＊点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 0.4A 500ml		投与順3				
5	点滴静注	20%マンニットール300ml 点滴静注: ＊点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	200ml		投与順4				
6	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液　500ml 点滴静注: ＊点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100mg/㎡ 計500ml		投与順5				
7	点滴静注	生理食塩液　500ml アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 点滴静注: ＊点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml 1A		投与順6				
8	点滴静注	ソルアセトF　500ml 点滴静注: ＊点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml		投与順7	投与順2	投与順2		
9	点滴静注	生理食塩液　500ml 5－FU 点滴静注: ＊点滴時間24時間 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 1000mg/㎡	投与順2	投与順8	投与順3	投与順3	投与順2	
10	点滴静注	生理食塩液　50ml 点滴静注: ＊点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン							投与順1