

【泌尿器 尿路上皮癌】
 インターバル日数:28日 基準日:day1

レジメン名称:GC 催吐性リスク:高度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	ゲムシタピン点滴静注用	1000mg/m ²		day1.8.15	—	炎症性
7	点滴静注	シスプラチン点滴静注	70mg/m ²		day2	—	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day8	day15
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 100ml	投与順1		投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	ゲムシタピン点滴静注用 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1000mg/m ² 100ml	投与順2				投与順2	投与順2
3	点滴静注	プロイメド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml		投与順1				
4	点滴静注	パロセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	0.75mg 6A 100ml		投与順2				
5	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml 20ml ソルデム1 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 0.4A 500ml		投与順3				
6	点滴静注	マンニゲン注20% 200ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	200ml		投与順4				
7	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: ※点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン	70mg/m ² 計500ml		投与順5				
8	点滴静注	生理食塩液 500ml アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 1A		投与順6				
9	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: ※点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml		投与順7	投与順2	投与順2		
10	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: ※点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml		投与順8	投与順3	投与順3		
11	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3				投与順3	投与順3