

【泌尿器 尿路上皮癌】

レジメン名称:GEP 催吐性リスク:高度

インターバル日数:28 日

基準日:day 1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	ゲムシタピン点滴静注	800mg/m ²		day1,8,15		炎症性
5	点滴静注	エトポシド点滴静注液	60mg/m ²		day1,2,3	PVCフリー	炎症性
6	点滴静注	シスプラチン点滴静注	20mg/m ²		day1,2,3		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day8	day15
1	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順1				
2	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 6A 100ml	投与順2				
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 100ml		投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
4	点滴静注	ゲムシタピン点滴静注用 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	800mg/m ² 100ml	投与順3			投与順2	投与順2
5	点滴静注	エトポシド点滴静注液 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	60mg/m ² 500ml	投与順4	投与順2	投与順2		
6	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン	20mg/m ² 500ml	投与順5	投与順3	投与順3		
7	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順6	投与順4	投与順4		
8	点滴静注	生理食塩液 20ml 点滴静注: 投与経路:末梢ルートメイン(ロック用)	20ml	投与順7	投与順5			
9	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴速度5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml				投与順3	投与順3