

【泌尿器 尿路上皮癌】

レジメン名称 ゲムシタビン+カルボプラチン

インターバル日数:21 日

基準日: day 1

催吐性リスク: 中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	ゲムシタビン注射用	1000mg/m ²		day1、8		炎症性
5	点滴静注	カルボプラチン点滴静注	AUC4.5		day1		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8
1	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順1	
2	点滴静注	グラニセトロン点滴静注3mg/100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1P 3A	投与順2	
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 100ml		投与順1
4	点滴静注	ゲムシタビン点滴静注用 大塚生食注 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1000mg/m ² 100ml	投与順3	投与順2
5	点滴静注	カルボプラチン点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	AUC4.5 250ml	投与順4	
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5	投与順3

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day2	day3
1	内服	デカドロン	4mg	4mg	4mg