

【泌尿器 尿路上皮癌】

レジメン名称:パクリタキセル+ゲムシタビン

インターバル日数:28日 基準日:day 1

催吐性リスク:軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	パクリタキセル注	90~110mg/m <sup>2</sup>		day1、8、15	PVCフリー/フィルター付き	壊死性
4	点滴静注	ゲムシタビン点滴静注用	800~1000mg/m <sup>2</sup>		day1、8、15		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	グラニセトロン点滴静注3mg/100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml ポララミン注5mg 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1P 4A 1A 1A	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	パクリタキセル注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	110mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	ゲムシタビン点滴静注用 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1000mg/m <sup>2</sup> 100ml	投与順4	投与順4	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5	投与順5	投与順5