

【泌尿器 前立腺癌】

レジメン名称:ジェブタナ

催吐性リスク:軽度

インターバル日数:21日間 基準日:day1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	ジェブタナ点滴静注	25mg/m <sup>2</sup>		day1	PVCフリー・フィルター付き	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液 1.65mg/0.5ml グラニセロン点滴静注 3mg/100ml ファモチジン静注20mg/20ml ポララミン注5mg * 点滴時間 30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 100ml 1A 1A	投与順2
3	点滴静注	ジェブタナ点滴静注液 5%ブドウ糖液 250ml 輸液量は適宜調節 <25mg:100ml 25~65mg:250ml >65mg:500ml * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	25mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4