

【肝細胞癌】

レジメン名称:テセントリク+アバスチン

インターバル日数:21日間 基準日:day 1

催吐性リスク:最小度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	テセントリク点滴静注	1200mg/body	-	day1	フィルター付き	非炎症性
4	点滴静注	アバスチン点滴用	15mg/kg	-	day1	-	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間 30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	テセントリク点滴静注 生理食塩液 250ml * 点滴時間 初回60分、2回目以降30分 投与経路:末梢ルートメイン	1200mg/body 250ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3
4	点滴静注	アバスチン点滴用 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間初回90分、2回目60分、3回目以降30分 投与経路:末梢ルートメイン	15mg/kg 100ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5