

【乳癌】

レジメン名称:PER+HER維持(初回)

インターバル日数:21日間 基準日:day1

催吐性リスク:軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	パージェタ点滴静注	840mg/body	—	day1	—	非炎症性
3	点滴静注	トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	—	day1	—	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	パージェタ点滴静注 生理食塩液 250ml * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	840mg 250ml	投与順2
3	点滴静注	トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 250ml 150mg/Vは注射用水7.2ml、 60mg/Vは注射用水3mlで溶解(21mg/ml) * 点滴時間90分 投与経路:末梢ルートメイン	8mg/kg 必要量 250ml	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4