

【乳癌】

レジメン名称:TC+トラスツズマブ(初回)

インターバル日数:21日間 基準日:day1

催吐性リスク:中等度

使用する抗癌剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 |
|----|------|----------------|----------------------|-----|------|-----|-------|
| 2 | 点滴静注 | ドセタキセル点滴静注液 | 75mg/m ² | — | day1 | — | 壊死性 |
| 3 | 点滴静注 | 注射用エンドキサン | 600mg/m ² | — | day1 | — | 炎症性 |
| 5 | 点滴静注 | トラスツズマブBS点滴静注用 | 8mg/kg | — | day1 | - | 非炎症性 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 |
|----|------|--|-------------------------------|------|
| 1 | 点滴静注 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセトロン点滴静注 3mg/100ml * 点滴時間 30分 投与経路:末梢ルートメイン | 4A 100ml | 投与順1 |
| 2 | 点滴静注 | ドセタキセル点滴静注液 大塚糖液 5% 250ml * 点滴時間 1時間 投与経路:末梢ルートメイン | 75mg/m ² 250ml | 投与順2 |
| 3 | 点滴静注 | 注射用エンドキサン 大塚糖液 5% 250ml * 点滴時間 30分 投与経路:末梢ルートメイン | 600mg/m ² 250ml | 投与順3 |
| 4 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン | 50ml | 投与順4 |
| 5 | 点滴静注 | トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 250ml 150mg/Vは注射用水7.2ml、 60mg/Vは注射用水3mlで溶解(21mg/ml) * 点滴時間90分 投与経路:末梢ルートメイン | 8mg/kg 必要量 250ml | 投与順5 |
| 6 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン | 50ml | 投与順6 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 | day4 |
|----|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 1 | 内服 | デカドロン | 8mg | - | 8mg | 8mg | 8mg |