

【乳癌】

レジメン名称:TC+トラスツズマブ(2回目以降)

インターバル日数:21日間 基準日:day1

催吐性リスク:中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	ドセタキセル点滴静注液	75mg/m ²	—	day1	—	壊死性
3	点滴静注	注射用エンドキサン	600mg/m ²	—	day1	—	炎症性
5	点滴静注	トラスツズマブBS点滴静注用	6mg/kg	—	day1	-	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセロン点滴静注 3mg/100ml * 点滴時間 30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 100ml	投与順1
2	点滴静注	ドセタキセル点滴静注液 大塚糖液 5% 250ml * 点滴時間 1時間 投与経路:末梢ルートメイン	75mg/m ² 250ml	投与順2
3	点滴静注	注射用エンドキサン 大塚糖液 5% 250ml * 点滴時間 30分 投与経路:末梢ルートメイン	600mg/m ² 250ml	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4
5	点滴静注	トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 250ml 150mg/Vは注射用水7.2ml、 60mg/Vは注射用水3mlで溶解(21mg/ml) * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	6mg/kg 必要量 250ml	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	8mg	-	8mg	8mg	8mg