

【乳がん】

レジメン名称: アブラキサン+キイトルーダ

催吐性リスク: 軽度

インターバル日数: 84日間 基準日: day1

★登録は28日毎に分けて(3-1)(3-2)(3-3)として登録している

使用する抗癌剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 |
|----|--------|------------|----------------------|-----|-----------------------------------|---------|-------|
| 2 | 中心静脈注射 | キイトルーダ点滴静注 | 200mg/body | — | day1、22、43、64 | フィルター付き | 非炎症性 |
| 6 | 中心静脈注射 | アブラキサン注 | 100mg/m ² | — | day1、8、15 29、36、43 57、64、71 | フィルター禁止 | 壊死性 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day8 | day15 | day22 | day29 | day36 | day43 | day57 | day64 | day71 |
|----|--------|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間 30分 投与経路:CVルートメイン | 100ml | 投与順1 | | | 投与順1 | | | 投与順1 | | 投与順1 | |
| 2 | 中心静脈注射 | キイトルーダ点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間 30分 投与経路:CVルートメイン | 200mg/body 100ml | 投与順2 | | | 投与順2 | | | 投与順2 | | 投与順2 | |
| 3 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:CVルートメイン | 50ml | 投与順3 | | | 投与順3 | | | 投与順3 | | 投与順3 | |
| 4 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:CVルートメイン側管 メインを止めて側管から投与 側管の1本目 | 50ml | 投与順4 | | | | | | 投与順4 | | 投与順4 | |
| 5 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン | 100ml | — | 投与順1 | 投与順1 | | 投与順1 | 投与順1 | — | 投与順1 | — | 投与順1 |
| 6 | 中心静脈注射 | アブラキサン点滴静注用 生理食塩液 50ml * 点滴時間30分 1Vあたり生食20mlで溶解 メインを止めて側管から投与 側管の2本目 投与経路:CVルートメイン側管 | 100mg/m ² 100mg(1V) あたり20ml | 投与順5 | 投与順2 | 投与順2 | | 投与順2 | 投与順2 | 投与順5 | 投与順2 | 投与順5 | 投与順2 |
| 7 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 メインを止めて側管から投与 側管の3本目 投与経路:CVルートメイン側管 | 50ml | 投与順6 | 投与順3 | 投与順3 | | 投与順3 | 投与順3 | 投与順6 | 投与順3 | 投与順6 | 投与順3 |