

【乳がん】

レジメン名称: アブラキサン+テセントリク

インターバル日数: 28日間 基準日: day1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	中心静脈注射	テセントリク点滴静注	840mg/body	—	day1、15	フィルター付き	非炎症性
5	中心静脈注射	アブラキサン注	100mg/m ²	—	day1、8、15	フィルター禁止	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間 30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1	—	投与順1
2	中心静脈注射	テセントリク点滴静注 生理食塩液 250ml * 点滴時間 初回60分、2回目以降30分 投与経路:CVルートメイン	840mg/body 250ml	投与順2	—	投与順2
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:CVルートメイン	50ml	投与順3	—	投与順3
4	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:CVルートメイン側管 メインを止めて側管から投与 側管の1本目	50ml	投与順4	—	投与順4
5	中心静脈注射	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	—	投与順1	—
6	中心静脈注射	アブラキサン点滴静注用 生理食塩液 50ml * 点滴時間30分 1Vあたり生食20mlで溶解 メインを止めて側管から投与 側管の2本目 投与経路:CVルートメイン側管	100mg/m ² 100mg(1V) あたり20ml	投与順5	投与順2 CVルートメイン	投与順5
7	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 メインを止めて側管から投与 側管の3本目 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順6	投与順3 CVルートメイン	投与順6