

【乳癌】

レジメン名称: パクリタキセル+アバスチン

インターバル日数: 28日間 基準日: day1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	パクリタキセル注射液	90mg/m <sup>2</sup>	—	day1.8.15	PVCフリー/フィルター付き	壊死性
4	点滴静注	アバスチン点滴静注用	10mg/kg	—	day1.15	-	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポラミン注5mg ファモチジン静注20mg/20ml 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 1A 1A 100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	パクリタキセル注射液 生理食塩液 250ml * 点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン	90mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 100ml * 点滴時間 初回90分 2回目60分、3回目以降30分 投与経路:末梢ルートメイン	10mg/kg 100ml	投与順4		投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5	投与順4	投与順5