

【乳癌】

レジメン名称 : パクリタキセル+キイトルーダ インターバル日数:84日間 基準日:day1
 催吐リスク : 軽度 ★登録は28日毎に分けて(3-1)(3-2)(3-3)として登録している

使用する抗がん剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 |
|----|--------|------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-------------------|-------|
| 2 | 中心静脈注射 | キイトルーダ点滴静注 | 200mg/body | | day1、22、43、64 | フィルター付き | 非炎症性 |
| 6 | 中心静脈注射 | パクリタキセル注射液 | 90mg/m ² | | day1、8、15 29、36、43 57、64、71 | PVCフリー フィルター付き | 壊死性 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day8 | day15 | day22 | day29 | day36 | day43 | day57 | day64 | day71 |
|----|--------|---|------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン | 100ml | 投与順1 | | | 投与順1 | | | 投与順1 | | 投与順1 | |
| 2 | 中心静脈注射 | キイトルーダ点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン | 200mg/body 100ml | 投与順2 | | | 投与順2 | | | 投与順2 | | 投与順2 | |
| 3 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン | 50ml | 投与順3 | | | 投与順3 | | | 投与順3 | | 投与順3 | |
| 4 | 中心静脈注射 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポラミン注5mg ファモチジン静注20mg/20ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン | 4A 1A 1A 100ml | 投与順4 | 投与順1 | 投与順1 | | 投与順1 | 投与順1 | 投与順4 | 投与順1 | 投与順4 | 投与順1 |
| 5 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン | 100ml | 投与順5 | 投与順2 | 投与順2 | | 投与順2 | 投与順2 | 投与順5 | 投与順2 | 投与順5 | 投与順2 |
| 6 | 中心静脈注射 | パクリタキセル注射液 大塚糖液 5% 250ml 点滴静注: ※点滴時間60分 投与経路:CVルートメイン | 90mg/m ² 250ml | 投与順6 | 投与順3 | 投与順3 | | 投与順3 | 投与順3 | 投与順6 | 投与順3 | 投与順6 | 投与順3 |
| 7 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン | 50ml | 投与順7 | 投与順4 | 投与順4 | | 投与順4 | 投与順4 | 投与順7 | 投与順4 | 投与順7 | 投与順4 |