

【乳癌】

レジメン名称:パクリタキセル+トラスツズマブ1週間毎(初回)

インターバル日数:7日間 基準日:day1

催吐性リスク:軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	中心静脈注射	トラスツズマブBS点滴静注用	4mg/kg	—	day1	—	非壊死性
6	中心静脈注射	パクリタキセル注	80mg/m ²	—	day1	PVCフリー/フィルター付き	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1
2	中心静脈注射	トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 250ml 150mg/Vは注射用水7.2ml、 60mg/Vは注射用水3mlで溶解(21mg/ml) * 点滴時間90分 投与経路:CVルートメイン	4mg/kg 必要量 250ml	投与順2
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	50ml	投与順3
4	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポラミン注5mg ファモチジン静注20mg/20ml 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	4A 1A 1A 100ml	投与順4
5	中心静脈注射	生理食塩液 100ml * 点滴時間 30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順5
6	中心静脈注射	パクリタキセル注 大塚糖液 5% 250ml * 点滴時間1時間 投与経路:CVルートメイン	80mg/m ² 250ml	投与順6
7	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間 5分 投与経路:CVルートメイン	50ml	投与順7